

Entre el año 2000 y 2010, en 43 de los 99 países con transmisión se ha registrado una reducción de casos de malaria o paludismo de más del 50%, mientras que en otros 8 países se han visto tendencias a la baja del 25% al 50%. Se calcula que en 2010 se produjeron unos 216 millones de casos de paludismo, de los que aproximadamente el 81% (174 millones de casos), se registraron en la Región de África. Según la OMS, los importes destinados a la lucha antipalúdica, pese a ser considerables, están aún lejos de cubrir los recursos necesarios para alcanzar los objetivos en cuanto al control de la enfermedad.

El Informe Mundial sobre la Malaria 2011 destaca los avances constantes en el logro de los objetivos internacionales para el control del paludismo fijados para 2010 y 2015.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los fondos dedicados al control del paludismo han permitido a los países endémicos aumentar considerablemente el acceso a redes mosquiteras tratadas con insecticida. Se estima que el porcentaje de hogares que cuentan con al menos una mosquitera tratada en el África subsahariana ha aumentado del 3% en el año 2000 al 50% en 2011.

La financiación internacional para el control de la enfermedad ha seguido aumentando hasta llegar a un máximo de 2.000 millones de dólares en 2011. Los importes destinados a la lucha antipalúdica, pese a serconsiderables, están aún lejos de cubrir los recursos necesarios para alcanzar los objetivos en cuanto al control de la enfermedad, que se estiman en más de 5.000 millones de dólares anuales para el periodo 2010-2015.

El Informe resume la información procedente de 106 países con paludismo endémico.

- Resumen del Informe Mundial sobre la Malaria 2011
- Prefacio de Margaret Chan, directora general de la OMS
- Informe completo
- Nota descriptiva sobre Paludismo