Organización Panamericana de la Salud
Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud

COSTA RICA

Datos Demográficos y Socioeconómicos

Población Total (miles)(2012)	4.794
Media Anual de Nacimientos (miles) (2012)	73,8
Mujeres en Edad Fértil (MEF) (miles) (2011)	1.289,9
Ingreso Nacional Bruto (US$ per cápita)	
Valor corriente (2011)	7.660
Tasa de mortalidad infantil (por 1000 nacidos vivos) (2011)	9,1
Población Bajo la Línea Internacional de Pobreza (%)(2009)	0,7
Gasto nacional en salud como % del PBI	
Gasto público (%) (2011)	4,3
Gasto privado (%) (2011)	3,1

Fuente: División de Población de Naciones Unidas; Oficina del Censo de los EUA; Banco Mundial; y OMS/OPS. 2012 o último año disponible.

Para más información:

- Perfil de país de la OPS: http://www.paho.org/spanish/dd/ais/cp_188.htm
- Perfil de inmunización de la OMS: http://www.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/countryprofileselect.cfm
- Perfil de GAVI – No aplica

Coberturas de Vacunación, 1995 – 2011



BCG= bacilo de Calmette-Guérin (vacuna contra la tuberculosis); DTP3 = tercera dosis de vacuna contra la difteria-pertussis (tos ferina)-tétanos (como DTP o como vacuna combinada); OPV3 = tercera dosis de vacuna antipoliomielítica; SRP = vacuna contra sarampión, rubéola y parotiditis; SRP2 = segunda dosis; Pentavalente = DPT-Hib-HepB

Esquema de Vacunación, 2011

BCG	RN			
Hepatitis B	RN	grupos de riesgo; trabaj. de salud		
VOP	2m	4m	6m	4a
DTP-Hib-HepB	2m	6m		
Hib	4m	15m		
DTP	4m	15m	4a	

Tdap	Posparto (“estrategia capullo”); grupos de riesgo				
SRP	15m	6-7a			
TT/Td	7a	cada 10a			
Influenza	grupos de riesgo; >6m a <8a con factores de riesgo; ≥65a				
Varicela	15m				
Neumococo conjugada	2m	4m	6m	15m	

RN: recién nacido; **m**=mes(es); **a**=año(s)

Datos de Morbilidad









Indicadores de Vigilancia, 2012

Parálisis Flácida Aguda (PFA)	País	Esperado
Número de casos.	23	
Tasa de PFA por 100.000<15 años de edad	2,01	1.0
% de casos investigados <48 horas	43	80
% con 1 muestra tomada dentro de 14 días del inicio .	91	80
% de sitios notificando	...	80

Sarampión/Rubéola	País	Esperado
Número de casos sospechosos	35	
% de sitios notificando semanalmente	...	80
% de casos con investigación adecuada.	20	80
% de casos con muestra adecuada	89	80
% de muestras que llegan al lab. <=5 días.	80	80
% de resultados de lab. notificados <=4 días	54	80

Fuente: ISIS, FCH-IM, OPS.

Aspectos Destacados:

- La caja Costarricense del Seguro Social, que implementa el programa de vacunación, compra sus vacunas a través del Fondo Rotatorio de la OPS. Todas las vacunas son compradas con fondos nacionales
- El país ha introducido la vacuna antineumocócica conjugada (2008) y la vacuna contra la varicela, más la vacuna Tdap para personas que están cercanas a recién nacidos (“estrategia capullo”)
- En 2004 se introdujo la vacuna contra la influenza estacional. Se usa para adultos mayores, 6m a 8 años con enfermedades crónicas y trabajadores de salud
- Costa Rica se encuentra implementando un proyecto piloto de demostración de vigilancia integrada de enfermedades prevenibles por vacunación con apoyo de OPS y CDC
- Exitosa campaña de seguimiento contra sarampión y rubéola en niños de 1 a 9 años, más polio en <5 años, en 2011, en el contexto de la Semana de Vacunación en las Américas
- Las coberturas sufrieron una tendencia al descenso, particularmente en 2009
- El país desarrolló un sistema de información de vacunación y vigilancia nominal con apoyo de OPS que está siendo implementado en 2011
- Costa Rica cuenta con un Comité Asesor de Prácticas de Inmunización