Organización Panamericana de la Salud
Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud

URUGUAY

Datos Demográficos y Socioeconómicos

Población Total (miles)(2012)	3.391
Media Anual de Nacimientos (miles) (2012)	49,2
Mujeres en Edad Fértil (MEF) (miles) (2011)	817.3
Ingreso Nacional Bruto (US$ per cápita)	
Valor corriente (2011)	11.860
Tasa de mortalidad infantil (por 1000 nacidos vivos) (2011)	8,9
Población Bajo la Línea Internacional de Pobreza (%)(2009)	0,0
Gasto nacional en salud como % del PBI	
Gasto público (%) (2009)	4,5
Gasto privado (%) (2010)	5,2

Fuente: División de Población de Naciones Unidas; Oficina del Censo de los EUA; Banco Mundial; y OMS/OPS. 2012 o último año disponible.

Para más información:

- Perfil de país de la OPS: http://www.paho.org/spanish/dd/ais/cp_858.htm
- Perfil de inmunización de la OMS: http://www.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/countryprofileselect.cfm
- Perfil de GAVI – No aplica

Coberturas de Vacunación, 1995 – 2012*



* Uruguay monitorea coberturas por cohorte

BCG= bacilo de Calmette-Guérin (vacuna contra la tuberculosis); DTP3 = tercera dosis de vacuna contra la difteria-pertussis (tos ferina)-tétanos (como DTP o como vacuna combinada); OPV3 = tercera dosis de vacuna antipoliomielítica; SRP = vacuna contra sarampión, rubéola y parotiditis; SRP2 = segunda dosis; Pentavalente = DPT-Hib-HepB

Esquema de Vacunación, 2011

BCG	RN				
VOP	2m	4m	6m	12m	
DPT					5a
DPT-Hib-HepB	2m	4m	6m	15m	
Hepatits B	12a	12a+1m	12a+6m	trabajadores de salud	
SRP	1a	5a			

TT/Td	12a	cada 10a	
Influenza	6m-29m; 65a+; áreas de riesgo		
Varicela	1a		
Hepatitis A	15m	21m	
Neumococo conjugada	2m	4m	12m
Neumococo polisacárido	≥65a		

RN: recién nacido; **m**=mes(es); **a**=año(s)

Datos de Morbilidad









Indicadores de Vigilancia, 2012

Parálisis Flácida Aguda (PFA)	País	Esperado
Número de casos.	2	
Tasa de PFA por 100.000<15 años de edad	0,.26	1,0
% de casos investigados <48 horas	0	80
% con 1 muestra tomada dentro de 14 días del inicio .	50	80
% de sitios notificando	0	80

Sarampión/Rubéola	País	Esperado
Número de casos sospechosos	10	
%de sitios notificando semanalmente	…	80
% de casos con investigación adecuada.	…	80
% de casos con muestra adecuada	30	80
% de muestras que llegan al lab. <=5 días.	100	80
% de resultados de lab. notificados <=4 días	67	80

… no se recibió el informe

Fuente: PESS, MESS e ISIS, FCH-IM, OPS.

Aspectos Destacados:

- Aunque el Ministerio de Salud lleva la vigilancia epidemiológica de inmunoprevenibles y compra los biológicos, la "Lucha Honoraria contra la Tuberculosis y Enfermedades Prevalentes" es el organismo que implementa el programa de inmunización
- El país compra sus vacunas al Fondo Rotatorio de la OPS, excepto la vacuna contra el neumococo que es compra directa al productor.
- La última evaluación internacional del PAI fue en noviembre de 2006
- Uruguay se encuentra evaluando el impacto del uso de la vacuna antineumocócica 7 valente, y la transición a la 13 valente.
- El programa de inmunización del Uruguay es considerado uno de los más exitosos de la Región: logra altas coberturas, cuenta un comité asesor de prácticas de inmunización de alto nivel, ha sido pionero en la introducción de nuevas vacunas y tiene un esquema de vacunación que incluye biológicos no usados comúnmente por otros países (varicela, hepatitis A, neumococo) y cuenta con un exhaustivo registro nominal informatizado que está siendo usado como modelo por otros países de la Región.