Organización Panamericana de la Salud
Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud

BOLIVIA

Datos Demográficos y Socioeconómicos

Población Total (miles)(2012)	10.248
Media Anual de Nacimientos (miles) (2012)	266,3
Mujeres en Edad Fértil (MEF) (miles) (2011)	2.547,6
Ingreso Nacional Bruto (US$ per cápita)	
Valor corriente (2011)	2.040
Tasa de mortalidad infantil (por 1000 nacidos vivos) ()	...
Población Bajo la Línea Internacional de Pobreza (%)(2007)	14
Gasto nacional en salud como % del PBI	
Gasto público (%) (2011)	2,1
Gasto privado (%) (2011)	1,6

Fuente: División de Población de Naciones Unidas; Oficina del Censo de los EUA; Banco Mundial; y OMS/OPS. 2012 o último año disponible.

Para más información:

- Perfil de país de la OPS: http://www.paho.org/spanish/dd/ais/cp_068.htm
- Perfil de inmunización de la OMS: http://www.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/countryprofileselect.cfm
- Perfil de GAVI – http://www.gavialliance.org/resources/cp_2004_bolivia.pdf

Coberturas de Vacunación, 1995 – 2011



BCG= bacilo de Calmette-Guérin (vacuna contra la tuberculosis); DTP3 = tercera dosis de vacuna contra la difteria-pertussis (tos ferina)-tétanos (como DTP o como vacuna combinada); OPV3 = tercera dosis de vacuna antipoliomielítica; SRP = vacuna contra sarampión, rubéola y parotiditis; SRP2 = segunda dosis; Pentavalente = DPT-Hib-HepB

Esquema de Vacunación, 2011

BCG	RN				
VOP	2m	4m	6m		
DTP-Hib-HepB	2m	4m	6m		
SRP	12m-23m				

TT/Td	MEF				
Fiebre Amarilla	12m – 23m				
Rotavirus	2m	4m			
Vitamina A	6-11m	1-4a			

RN: recién nacido; **MEF:** mujeres en edad fértil; **m**=mes(es); **a**=año(s)

Datos de Morbilidad









Indicadores de Vigilancia, 2012

Parálisis Flácida Aguda (PFA)	País	Esperado
Número de casos.	45	
Tasa de PFA por 100.000<15 años de edad	1,24	1.0
% de casos investigados <48 horas	87	80
% con 1 muestra tomada dentro de 14 días del inicio .	93	80
% de sitios notificando	...	80

Sarampión/Rubéola	País	Esperado
Número de casos sospechosos	215	
%de sitios notificando semanalmente	...	80
% de casos con investigación adecuada.	100	80
% de casos con muestra adecuada	100	80
% de muestras que llegan al lab. <=5 días.	86	80
% de resultados de lab. notificados <=4 días	95	80

Fuente: PESS, MESS, FCH-IM, OPS.

Aspectos Destacados:

- Diciembre 2005: promulgación de la ley de vacunas
- Mayo 2006: campaña nacional de eliminación de la rubéola y del síndrome de rubéola congénita (de 15 a 39 años).
- Mayo 2007: campaña nacional de vacunación contra la fiebre amarilla (de 2 a 44 años)
- Octubre 2004: campaña nacional de seguimiento con vacuna contra sarampión y rubéola (de 2 a 14 años)