Encuesta Mundial de Salud a Escolares (GSHS)

# Antigua y Barbuda

## 2009 - Hoja resumida de resultados

La GSHS de Antigua y Barbuda en el 2009 midió el uso del alcohol; conducta alimentaria; consumo de drogas; higiene; salud mental; actividad física; factores protectores; conductas sexuales; consumo de tabaco; y violencia y lesiones no intencionales.

En la GSHS de Antigua y Barbuda en el 2009 se encuestaron estudiantes en las formas 1-4 y grados 7-9. El diseño de la muestra fue por conglomerados en dos etapas para producir datos representativos de todos los estudiantes en las formas 1-4 y grados 7-9 en Antigua y Barbuda. En la primera etapa se seleccionaron las escuelas con una probabilidad proporcional al número de estudiantes matriculados. En la segunda etapa, se seleccionaron las clases al azar y todos los estudiantes en las clases seleccionadas fueron invitados a participar. La tasa de respuesta de las escuelas fue de un 95%, la tasa de respuesta de los estudiantes fue de un 71%, y la tasa total de respuesta fue de un 67%. En total, 1266 estudiantes participaron en la GSHS de Antigua y Barbuda. Los estudiantes escribieron sus contestaciones a cada pregunta en una hoja de respuestas diseñada para lectura óptica por computadora. Para facilitar comparaciones, esta hoja de información solo incluye estudiantes de 13 a 15 años.

| Resultados para estudiantes de 13-15 años | Total | Niños | Niñas |
|---|---|---|---|
| **Consumo de alcohol** | | | |
| Entre los estudiantes que han bebido alcohol (aparte de unos pocos sorbos), el porcentaje de estudiantes que tomaron su primera bebida de alcohol antes de los 14 años. | 86.5 (81.6-90.3) | 85.9 (78.4-91.0) | 88.2 (82.9-91.9) |
| Porcentaje de estudiantes que han bebido al menos una bebida de alcohol, una o más veces durante los últimos 30 días. | 45.1 (40.9-49.5) | 43.8 (38.4-49.3) | 45.7 (39.7-51.9) |
| Porcentaje de estudiantes que en una o más ocasiones en su vida tomaron tanto alcohol que llegaron a emborracharse. | 22.7 (19.7-26.0) | 26.1 (21.8-30.8) | 19.5 (16.0-23.5) |
| **Conductas de alimentación y peso** | | | |
| Porcentaje de estudiantes que tomaron bebidas gaseosas, una o más veces al día, en los últimos 30 días. | 58.8 (55.1-62.4) | 59.6 (55.7-63.4) | 57.7 (52.1-63.1) |
| Porcentaje de estudiantes que comieron habitualmente fruta, dos o más veces al día, en los últimos 30 días. | 40.8 (37.5-44.1) | 44.1 (39.6-48.6) | 36.0 (31.8-40.4) |
| Porcentaje de estudiantes que comieron habitualmente vegetales, tres o más veces al día, en los últimos 30 días. | 22.4 (19.6-25.5) | 24.7 (21.2-28.6) | 19.5 (16.0-23.6) |
| Porcentaje de estudiantes que comieron habitualmente frutas y vegetales, cinco o más veces al día, en los últimos 30 días. | 26.7 (23.9-29.7) | 30.7 (26.8-34.7) | 21.4 (17.4-26.1) |
| **Consumo de drogas** | | | |
| Entre los estudiantes que han utilizado drogas, el porcentaje que consumió drogas, por primera vez, antes de los 14 años. | 79.1 (73.7-83.6) | 78.6 (71.4-84.4) | 79.6 (71.5-86.0) |
| **Higiene** | | | |
| Porcentaje de estudiantes que se limpiaron o cepillaron los dientes menos de una vez al día en los últimos 30 días. | 3.0 (2.2-4.0) | 3.8 (2.5-5.7) | 2.0 (1.3-3.2) |
| Porcentaje de estudiantes que nunca o rara vez se lavaron las manos antes de comer durante los últimos 30 días. | 5.2 (3.9-6.8) | 5.4 (3.7-7.9) | 4.9 (3.4-7.0) |
| **Salud mental** | | | |
| Porcentaje de estudiantes que consideraron seriamente la posibilidad de suicidarse en los últimos 12 meses. | 17.4 (15.1-19.8) | 12.6 (9.4-16.5) | 22.5 (18.9-26.5) |
| Porcentaje de estudiantes que intentaron suicidarse una o más veces durante los últimos 12 meses. | 12.3 (10.3-4.6) | 9.3 (7.0-12.2) | 15.7 (12.1-20.0) |

# Antigua y Barbuda

## 2009 - Hoja resumida de resultados

| Resultados para estudiantes de 13-15 años | Total | Niños | Niñas |
|---|---|---|---|
| Porcentaje de estudiantes que no tienen amigos muy cercanos. | 8.5 (6.8-10.6) | 11.3 (8.5-14.8) | 5.7 (4.0-8.3) |
| **Actividad física** | | | |
| Porcentaje de estudiantes que realizaron alguna actividad física, por un total de al menos 60 minutos al día, en cinco o más días de los últimos 7 días. | 31.8 (27.3-36.8) | 36.5 (29.7-43.8) | 27.0 (22.7-31.7) |
| Porcentaje de estudiantes que han asistido a clases de educación física tres o más veces por semana durante el año escolar. | 26.4 (22.2-31.2) | 28.5 (23.2-34.4) | 23.8 (19.5-28.6) |
| Porcentaje de estudiantes que habitualmente pasan tres o más horas al día sentados o haciendo actividades sedentarias. | 54.8 (50.6-58.9) | 50.3 (45.2-55.3) | 59.5 (53.9-64.9) |
| **Factores protectores** | | | |
| Porcentaje de estudiantes que faltaron a clase o a la escuela sin permiso uno o más días en los últimos 30 días. | 24.4 (20.9-28.2) | 27.1 (22.1-32.6) | 21.3 (16.7-26.8) |
| Porcentaje de estudiantes cuyos padres o tutores entendieron sus problemas o preocupaciones casi siempre o siempre durante los últimos 30 días. | 32.7 (29.7-35.8) | 31.9 (27.6-36.5) | 34.4 (29.5-39.7) |
| Porcentaje de estudiantes cuyos padres o tutores sabían realmente lo que el estudiante estaba hacienda en su tiempo libre durante los últimos 30 días. | 39.4 (36.2-42.8) | 35.5 (30.8-40.5) | 43.7 (38.4-49.1) |
| **Salud sexual y reproductiva** | | | |
| Porcentaje de estudiantes que han tenido alguna vez relaciones sexuales. | 37.1 (32.7-41.7) | 49.4 (44.1-54.7) | 23.8 (18.8-29.7) |
| Entre los estudiantes que han tenido relaciones sexuales, el porcentaje que tuvo relaciones sexuales por primera vez antes de los 14 años. | 76.3 (70.8-81.0) | 82.8 (77.6-87.0) | 61.8 (50.3-72.2) |
| Entres los estudiantes que han tenido relaciones sexuales, el porcentaje que utilizó un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales. | 68.4 (63.0-73.4) | 67.7 (61.1-73.6) | 68.5 (59.4-76.4) |
| **Consumo de tabaco** | | | |
| Entre los estudiantes que fumaron cigarrillos, el porcentaje de ellos que probó un cigarrillo antes de los 14 años. | 89.9 (84.4-93.7) | 89.0 (82.6-93.2) | 90.4 (83.3-94.7) |
| Porcentaje de estudiantes que fumaron cigarrillos, uno o más días en los últimos 30 días. | 7.4 (5.8-9.4) | 8.2 (6.2-10.8) | 6.1 (4.2-8.8) |
| Porcentaje de estudiantes que reportaron que otras personas fumaron cerca de ellos, uno o más días durante los últimos 7 días. | 53.2 (49.1-57.1) | 55.4 (49.6-61.0) | 49.7 (45.0-54.3) |
| **Lesiones no intencionales y violencia** | | | |
| Porcentaje de estudiantes que participaron en una pela física, una o más veces en los últimos 12 meses. | 47.5 (43.2-51.9) | 55.1 (49.9-60.1) | 38.4 (31.8-45.5) |
| Porcentaje de estudiantes que tuvieron una lesión seria, una o más veces, durante los últimos 12 meses. | 50.8 (46.3-55.3) | 53.5 (47.6-59.3) | 46.2 (40.2-52.3) |
| Porcentaje de estudiantes que fueron intimidados uno o más días durante los últimos 30 días. | 24.9 (21.8-28.3) | 23.5 (19.3-28.2) | 26.7 (22.2-31.8) |

**Para mayor información favor contactar:**

**Cleo Clothilda Hampson,**
**Coordinador de salud materno infantil Ministerio de Salud,**
**Antigua, hampson_ccm@hotmail.com**