Encuesta Mundial de Salud a Escolares (GSHS)

Antigua

2009 - Hoja resumida de resultados

La GSHS de Antigua en el 2009 midió el uso del alcohol; conducta alimentaria; consumo de drogas; higiene; salud mental; actividad física; factores protectores; conductas sexuales; consumo de tabaco; y violencia y lesiones no intencionales.

En la GSHS de Antigua en el 2009 se encuestaron estudiantes en las formas 1-4 y grados 7-9. El diseño de la muestra fue por conglomerados en dos etapas para producir datos representativos de todos los estudiantes en las formas 1-4 y grados 7-9 en Antigua. En la primera etapa se seleccionaron las escuelas con una probabilidad proporcional al número de estudiantes matriculados. En la segunda etapa, se seleccionaron las clases al azar y todos los estudiantes en las clases seleccionadas fueron invitados a participar. La tasa de respuesta de las escuelas fue de un 95%, la tasa de respuesta de los estudiantes fue de un 71%, y la tasa total de respuesta fue de un 67%. En total, 1186 estudiantes participaron en la GSHS de Antigua. Los estudiantes escribieron sus contestaciones a cada pregunta en una hoja de respuestas diseñada para lectura óptica por computadora. Para facilitar comparaciones, esta hoja de información solo incluye estudiantes de 13 a 15 años.

Resultados para estudiantes de 13-15 años	Total	Niños	Niñas
Consumo De Alcohol			
Entre los estudiantes que han bebido alcohol (aparte de unos pocos sorbos), el porcentaje de estudiantes que tomaron su primera bebida de alcohol antes de los 14 años.	**86.8 (81.8-90.6)**	**86.1 (78.4-91.3)**	**88.2 (82.9-92.1)**
Porcentaje de estudiantes que han bebido al menos una bebida de alcohol, una o más veces durante los últimos 30 días.	**44.8 (40.5-49.2)**	**43.5 (38.0-49.0)**	**45.5 (39.4-51.7)**
Porcentaje de estudiantes que en una o más ocasiones en su vida tomaron tanto alcohol que llegaron a emborracharse.	**22.5 (19.5-25.8)**	**25.8 (21.5-30.6)**	**19.5 (15.9-23.6)**
Conductas de alimentación y peso			
Porcentaje de estudiantes que tomaron bebidas gaseosas, una o más veces al día, en los últimos 30 días.	**58.4 (54.7-62.0)**	**59.1 (55.3-62.9)**	**57.3 (51.7-62.8)**
Porcentaje de estudiantes que comieron habitualmente fruta, dos o más veces al día, en los últimos 30 días.	**40.5 (37.2-43.8)**	**43.7 (39.2-48.2)**	**35.8 (31.6-40.2)**
Porcentaje de estudiantes que comieron habitualmente vegetales, tres o más veces al día, en los últimos 30 días.	**22.4 (19.5-25.5)**	**24.6 (21.0-28.6)**	**19.6 (16.0-23.7)**
Porcentaje de estudiantes que comieron habitualmente frutas y vegetales, cinco o más veces al día, en los últimos 30 días.	**26.6 (23.9-29.7)**	**30.6 (26.7-34.8)**	**21.2 (17.1-25.9)**
Consumo de drogas			
Entre los estudiantes que han utilizado drogas, el porcentaje que consumió drogas, por primera vez, antes de los 14 años.	**79.1 (73.6-83.7)**	**78.5 (71.2-84.4)**	*
Higiene			
Porcentaje de estudiantes que se limpiaron o cepillaron los dientes menos de una vez al día en los últimos 30 días.	**3.0 (2.2-4.0)**	**3.8 (2.5-5.7)**	**2.0 (1.3-3.3)**
Porcentaje de estudiantes que nunca o rara vez se lavaron las manos antes de comer durante los últimos 30 días.	**5.1 (3.9-6.8)**	**5.3 (3.6-7.9)**	**4.8 (3.3-7.0)**
Salud Mental			
Porcentaje de estudiantes que consideraron seriamente la posibilidad de suicidarse en los últimos 12 meses.	**17.3 (15.0-19.8)**	**12.5 (9.3-16.6)**	**22.3 (18.7-26.4)**
Porcentaje de estudiantes que intentaron suicidarse una o más veces durante los últimos 12 meses.	**12.0 (10.1-14.3)**	**9.0 (6.7-11.9)**	**15.3 (11.8-19.7)**

Antigua

2009 - Hoja resumida de resultados

Resultados para estudiantes de 13-15 años	Total	Niños	Niñas
Porcentaje de estudiantes que no tienen amigos muy cercanos.	8.6 (6.8-10.7)	11.4 (8.6-15.0)	5.7 (3.9-8.3)
Actividad Física			
Porcentaje de estudiantes que realizaron alguna actividad física, por un total de al menos 60 minutos al día, en cinco o más días de los últimos 7 días.	31.9 (27.3-37.0)	36.7 (29.8-44.2)	26.9 (22.6-31.7)
Porcentaje de estudiantes que han asistido a clases de educación física tres o más veces por semana durante el año escolar.	26.6 (22.3-31.4)	28.7 (23.3-34.7)	23.9 (19.6-28.8)
Porcentaje de estudiantes que habitualmente pasan tres o más horas al día sentados o haciendo actividades sedentarias.	54.8 (50.6-59.1)	50.4 (45.2-55.5)	59.6 (53.8-65.1)
Factores Protectores			
Porcentaje de estudiantes que faltaron a clase o a la escuela sin permiso uno o más días en los últimos 30 días.	24.1 (20.6-28.0)	26.8 (21.8-32.4)	21.1 (16.5-26.7)
Porcentaje de estudiantes cuyos padres o tutores entendieron sus problemas o preocupaciones casi siempre o siempre durante los últimos 30 días.	32.5 (29.5-35.7)	31.8 (27.5-36.5)	34.2 (29.2-39.5)
Porcentaje de estudiantes cuyos padres o tutores sabían realmente lo que el estudiante estaba hacienda en su tiempo libre durante los últimos 30 días.	39.4 (36.1-42.9)	35.6 (30.8-40.6)	43.5 (38.2-48.9)
Salud sexual y reproductiva			
Porcentaje de estudiantes que han tenido alguna vez relaciones sexuales.	36.9 (32.5-41.6)	49.2 (43.8-54.6)	23.7 (18.6-29.7)
Entre los estudiantes que han tenido relaciones sexuales, el porcentaje que tuvo relaciones sexuales por primera vez antes de los 14 años.	76.3 (70.7-81.1)	82.8 (77.5-87.1)	61.5 (49.8-72.0)
Entres los estudiantes que han tenido relaciones sexuales, el porcentaje que utilizó un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales.	68.2 (62.7-73.2)	67.2 (60.6-73.2)	68.6 (59.3-76.6)
Consumo de tabaco			
Entre los estudiantes que fumaron cigarrillos, el porcentaje de ellos que probó un cigarrillo antes de los 14 años.	90.0 (84.3-93.8)	89.0 (82.4-93.3)	90.4 (83.2-94.7)
Porcentaje de estudiantes que fumaron cigarrillos, uno o más días en los últimos 30 días.	7.4 (5.8-9.4)	8.1 (6.1-10.7)	6.2 (4.2-8.9)
Porcentaje de estudiantes que reportaron que otras personas fumaron cerca de ellos, uno o más días durante los últimos 7 días.	53.1 (49.0-57.2)	55.3 (49.4-61.0)	49.7 (45.0-54.5)
Lesiones no intencionales y violencia			
Porcentaje de estudiantes que participaron en una pela física, una o más veces en los últimos 12 meses.	47.1 (42.8-51.5)	54.8 (49.6-59.9)	38.1 (31.4-45.2)
Porcentaje de estudiantes que tuvieron una lesión seria, una o más veces, durante los últimos 12 meses.	50.4 (45.9-54.9)	53.1 (47.2-59.0)	45.8 (39.8-52.0)
Porcentaje de estudiantes que fueron intimidados uno o más días durante los últimos 30 días.	24.4 (21.4-27.7)	22.7 (18.8-27.1)	26.5 (21.9-31.7)

* Indica menos de 100 estudiantes.

Para mayor información favor contactar:

Cleo Clothilda Hampson,
Coordinador de salud materno infantil Ministerio de Salud,
Antigua, hampson_ccm@hotmail.com